

ALOC (Altered Level Of Consciousness) (nivel de conciencia alterado)

Término

Término

ALOC (Altered Level Of Consciousness)

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Médico Cirujano (422)

Temática

Sintomatología

Definición del término

State in which a person either has decreased cognitive function or cannot be easily aroused.

Fuente / Autor (del término)

Morrow, A. (2020, 21 febrero). The Categories of Level of Consciousness in Medicine. Verywell Health. Recuperado 23 de marzo de 2022, de <https://www.verywellhealth.com/level-of-consciousness-1132154>

Contexto del término

A daily part of emergency medicine practice involves assessing patients with altered levels of consciousness (ALOC), and determining when impairment reaches levels that warrant diagnostic or therapeutic interventions.

Fuente / Autor (del contexto)

Gill, M., Green, S. M., & Krauss, B. (2003). Can the bispectral index monitor quantify altered level of consciousness in emergency department patients?. Academic emergency

Español

Equivalente en español

nivel de conciencia alterado

Categoría gramatical

Nominal (221)

Variante de traducción

alteración del estado de conciencia

Información geográfica de la variante en español

México (Mex.) (192)

Definición del término en español

Estado mental que puede ser reconocido subjetivamente por un individuo (o por un observador objetivo del individuo) como diferente, en funciones psicológicas, del estado de alerta y de vigilia.

Fuente / Autor (del término en español)

Méndez, M. (2007). Estados alterados v/s no-ordinarios de conciencia: un marco transpersonal-integral para comprender la ingesta ceremonial de enteógenos. Cuadernos de neuropsicología, 1(3), 182-195. Recuperado 23 de marzo de 2022, de bit.ly/3K69eFY

Contexto del término en español

En el análisis de regresión logística binaria el modelo final estadísticamente sostenible fue el configurado por las variables fiebre, taquipnea, nivel de conciencia alterado, presencia de diarreas, uso de diuréticos e infusiones de soluciones hipertónicas.

Fuente / Autor (del contexto en español)

Cieza Zevallos, J. A., Strobbe Barbat, M., & Ortiz Soriano, V. (2017). Factores asociados a la incidencia de hipernatremia intrahospitalaria en pacientes adultos de un servicio de Medicina de Lima, Perú. Revista Médica Herediana, 27(4), 199. doi.org/hng2

Multimedia

Video YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=sOmM2xQiQ0w>

Fuente / Autor video

Externa

URL de la fuente (video)

<https://www.youtube.com/watch?v=sOmM2xQiQ0w>

Formatos de descarga

- [PDF](#)
- [CSV](#)
- [XLS](#)
- [TXT](#)