

# Serous borderline tumor (SBT) (Tumor borderline seroso (TSB))

<b>Término</b>	Serous borderline tumor (SBT)
<b>Idioma</b>	Inglés (Estados Unidos) (214)
<b>Área Especialidad</b>	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
<b>Disciplina</b>	Médico Cirujano (422)
<b>Temática</b>	Cáncer de ovario
<b>Definición del término</b>	Serous neoplasms that show epithelial proliferation greater than that seen in serous cystadenomas.
<b>Fuente / Autor (del término)</b>	Srinivasamurthy, B, Ambedkar R, Krishnan N, et al. (2015). Ovarian serous borderline tumors with noninvasive and invasive peritoneal implants: A case report each. Journal of Cancer Research and Therapeutics. 11(3) <a href="https://www.cancerjournal.net/article.asp">https://www.cancerjournal.net/article.asp</a>
<b>Contexto del término</b>	In 2007, Russel Hogg et al., studied 46 patients with serous borderline tumors. 13 of 46 (28%) serous borderline tumors had a micropapillary pattern, 12 (26%) had evidence of microinvasion and 19 (41%) had extraovarian implants, of which one (5%) was invasive. Three of 46 (7%) of serous borderline tumors recurred, all were originally advanced stage.

---

<b>Fuente / Autor (del contexto)</b>	Srinivasamurthy, B, Ambedkar R, Krishnan N, et al. (2015). Ovarian serous borderline tumors with noninvasive and invasive peritoneal implants: A case report each. Journal of Cancer Research and Therapeutics. 11(3) <a href="https://www.cancerjournal.net/article.as">https://www.cancerjournal.net/article.as</a>
<b>Equivalente en español</b>	Tumor borderline seroso (TSB)
<b>Categoría gramatical</b>	Nominal (221)
<b>Variante de traducción</b>	Tumores de bajo potencial de malignidad (borderline tumor)
<b>Información geográfica de la variante en español</b>	México (Mex.) (192)
<b>Definición del término en español</b>	Neoplasias que presentan una mayor proliferación epitelial que los tumores benignos, pero sin invasión destructiva del estroma.
<b>Fuente / Autor (del término en español)</b>	Cisterna, C, Orellana H, Ricardo, y Freiré H. (2007). Tumor ovárico de bajo potencial maligno (borderline): patrón seroso micropapilar. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 72(4), 241-246. <a href="https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262007000400008">https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262007000400008</a>
<b>Contexto del término en español</b>	Los tumores serosos borderline (TSB) representan el 25-30% de los tumores serosos potencialmente malignos (14,15). Ocurren más frecuentemente durante la 4. <sup>a</sup> y 5. <sup>a</sup> décadas y la edad media de las pacientes es de 42 años. Aunque suelen ser asintomáticos, pueden acompañarse de aumento del perímetro abdominal y dolor debido a torsión o ruptura.

---

---

**Fuente / Autor (del contexto en español)**

Cisterna, C, Orellana H, Ricardo, y Freiré H. (2007). Tumor ovárico de bajo potencial maligno (boderline): patrón seroso micropapilar. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 72(4), 241-246.  
<https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262007000400008>

---

**Opciones no recomendadas**

Tumores proliferativos o atípicos.

---

**Comentarios**

Tumor borderline seroso (TSB) y tumor de bajo potencial de malignidad (borderline tumor) se utilizan como sinónimos.

---