

# Behavior Pain Scale (BPS) (escala conductual del dolor)

## **Término**

### **Término**

Behavior Pain Scale (BPS)

### **Idioma**

Inglés (Estados Unidos) (214)

### **Área Especialidad**

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

### **Disciplina**

Médico Cirujano (422)

### **Temática**

Pruebas diagnósticas

### **Definición del término**

A tool that can be used to assess pain in in adults, including those in the intensive care unit (ICU).

### **Fuente / Autor (del término)**

Society Critical Care Medicine. (2022). Behavior Pain Scale (BPS). LearnICU. Recuperado el 30 de mayo de 2022, de [https://www.sccm.org/ICULiberation/Resources/Behavioral-Pain-Scale-\(BPS\)](https://www.sccm.org/ICULiberation/Resources/Behavioral-Pain-Scale-(BPS))

### **Contexto del término**

Common pain assessment tools might not be the suitable tools to measure ventilated, critically ill patients' pain. The Behavioral Pain Scale measures observable behavior indicative of pain experienced by mechanically ventilated patients.

### **Fuente / Autor (del contexto)**

Chen, Y.-Y., Lai, Y.-H., Shun, S.-C., Chi, N.-H., Tsai, P.-S., & Liao, Y.-M. (2011). The Chinese Behavior Pain Scale for critically ill patients: Translation and psychometric testing. En

## **Español**

### **Equivalente en español**

escala conductual del dolor

### **Categoría gramatical**

Nominal (221)

### **Información geográfica de la variante en español**

México (Mex.) (192)

### **Definición del término en español**

Evaluación que intenta evaluar el dolor de los pacientes en cuidados Intensivos que no pueden manifestarlo con otros tipos de escalas, debido a que están sedados y/o sometidos a ventilación mecánica.

### **Fuente / Autor (del término en español)**

Sociedad Andaluza de medicina Intensiva y Unidades Coronarias. (2022). Behavioral Pain Scale (BPS). Recuperado el 30 de mayo de 2022 de <https://www.samiuc.es/behavioral-pain-scale-bps/>

### **Contexto del término en español**

Por otro lado, la escala conductual del dolor es un ejemplo útil para evaluar al paciente que se encuentra bajo sedación e intubación orotraqueal, ya que evalúa características faciales, a nivel de extremidades y el acople al ventilador).

### **Fuente / Autor (del contexto en español)**

García Ramírez, P. E., Valenzuela Molina, L. C., Zazueta Araujo, E., López Morales, C. M., Cabello Molina, R., & Martínez Hernández Magro, P. (2017). Prevalencia de dolor en pacientes hospitalizados en UCIM con intubación orotraqueal y bajo sedación, medi

## **Multimedia**

### **Imagen**

# Behavioral Pain Scale (BPS) 3-12

Item	Description	Score
Facial expression	Relaxed	1
	Partially tightened (eg, brow lowering)	2
	Fully tightened (eg, eyelid closing)	3
	Grimacing	4
Upper limbs	No movement	1
	Partially bent	2
	Fully bent with finger flexion	3
	Permanently retracted	4
Compliance with ventilation	Tolerating movement	1
	Coughing but tolerating ventilation for most of the time	2
	Fighting ventilator	3
	Unable to control ventilation	4

Payen JF, et al. *Crit Care Med.* 2001;29(12):2258-2263.

## Fuente / Autor imagen

Externa

## URL de la fuente (imagen)

<https://i.pinimg.com/originals/ff/4c/36/ff4c36e79085c3fd551b84848f5f88f1.jpg>

## Video YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=yiyhHWrXtLU>

## Fuente / Autor video

Externa

## URL de la fuente (video)

<https://www.youtube.com/watch?v=yiyhHWrXtLU>

## Formatos de descarga

- [PDF](#)
- [CSV](#)
- [XLS](#)
- [TXT](#)