

atrioventricular block (bloqueo auriculoventricular)

Término

Término

atrioventricular block

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Médico Cirujano (422)

Temática

Cardiología

Definición del término

Any interruption of the conduction of electrical impulses from the atria to the ventricles; it can occur at the level of the atria, the atrioventricular node, the bundle of His, or the Purkinje system.

Fuente / Autor (del término)

Atrioventricular block. (2003) Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. Recuperado el 06 de junio de <https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/atrioventricular+block>

Contexto del término

Atrioventricular block (AVB) is a well-recognized condition due in most cases either to idiopathic disease of ventricular conduction tissue, the His-Purkinje system, or to ischemic damage to this tissue. Amongst the less common causes are invasion of calcification from calcific aortic valve stenosis and congenital.

Fuente / Autor (del contexto)

Sutton, R. (2020). Reflex Atrioventricular Block. En Frontiers in Cardiovascular Medicine (Vol. 7). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2020.00048>

Español

Equivalente en español

bloqueo auriculoventricular

Categoría gramatical

Nominal (221)

Variante de traducción

bloqueo atrioventricular, bloqueo cardíaco

Información geográfica de la variante en español

México (Mex.) (192)

Definición del término en español

Bloqueo en la conducción de los estímulos eléctricos auriculares a los ventrículos a través del nódulo auriculoventricular, que se clasifica en tres grados.

Fuente / Autor (del término en español)

Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Bloqueo auriculoventricular. En Diccionario de Términos Médicos. Recuperado el 06 de junio de 2022, de https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=Bloqueo%20auriculoventricular

Contexto del término en español

Posteriormente, a los 29 años de edad presentó disnea, lipotimia y un episodio de síncope; acude a servicio de urgencias donde se evidenció bloqueo auriculoventricular completo (Fig. 1), por lo que se colocó marcapasos bicameral en modo DDDR por servicio de electrofisiología. Se colocaron electrodos en aurícula derecha y a nivel del ápex de ventrículo único (Fig. 2).


Fuente / Autor (del contexto en español)

Borges López, J., Cuevas Campillo, A., Rosas Munive, E., Ochoa Pérez, V., Castaño Guerra, R., & Ayala Hernández, E. (2022). Corazón univentricular asociado a bloqueo auriculoventricular congénito en un paciente adulto. Revista Cubana de Cardiología y Ciru

Multimedia

Imagen

Bloqueo A-V tercer grado o completo



La onda P y el complejos QRS no guardan relación entre sí, siendo la frecuencia de la onda P mayor.

QRS puede se ancho o estrecho

R-R regular

Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

<https://mischuletasmedicas.files.wordpress.com/2019/06/av-3.jpg?w=840>

Video YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=-h6DI5vaPx8>

Fuente / Autor video

Externa

URL de la fuente (video)

<https://www.youtube.com/watch?v=-h6DI5vaPx8>

Notas para la traducción

Opciones no recomendadas

bloqueo atrioventricular, bloqueo cardíaco

Comentarios

Con frecuencia abreviado como "bloqueo AV".

Formatos de descarga

- [PDF](#)
- [CSV](#)
- [XLS](#)
- [TXT](#)