

atrioventricular block (bloqueo auriculoventricular)

Término	atrioventricular block
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Médico Cirujano (422)
Temática	Cardiología
Definición del término	Any interruption of the conduction of electrical impulses from the atria to the ventricles. It can occur at the level of the atria, the atrioventricular node, the bundle of His, or the Purkinje fiber system.
Fuente / Autor (del término)	Atrioventricular block. (2003) Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing and Allied Health, Seventh Edition. Recuperado el 06 de junio de https://medicaldictionary.thefreedictionary.com/atrioventricular+block
Contexto del término	Atrioventricular block (AVB) is a well-recognized condition due in most cases to a disease of ventricular conduction tissue, the His-Purkinje system, or to ischemic heart disease of the conduction tissue. Amongst the less common causes are invasion of calcification from atherosclerosis, stenosis and congenital.
Fuente / Autor (del contexto)	Sutton, R. (2020). Reflex Atrioventricular Block. En Frontiers in Cardiovascular Medicine. Frontiers Media SA. https://doi.org/10.3389/fcvm.2020.00048
Equivalente en español	bloqueo auriculoventricular
Categoría gramatical	Nominal (221)

Variante de traducción	bloqueo atrioventricular, bloqueo cardíaco
Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Bloqueo en la conducción de los estímulos eléctricos auriculares a los ventrículos a través del nódulo auriculoventricular, que se clasifica en tres grados.
Fuente / Autor (del término en español)	Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Bloqueo auriculoventricular. Términos Médicos. Recuperado el 06 de junio de 2022, de https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=Bloqueo%
Contexto del término en español	Posteriormente, a los 29 años de edad presentó disnea, lipotimia y un episodio de síncope. Fue admitido al hospital y acude a servicio de urgencias donde se evidenció bloqueo auriculoventricular de primer grado. Posteriormente, por lo que se colocó marcapasos bicameral en modo DDDR por servicio de cardiología. Se colocaron electrodos en aurícula derecha y a nivel del ápex de ventrículo izquierdo.
Fuente / Autor (del contexto en español)	Borges López, J., Cuevas Campillo, A., Rosas Munive, E., Ochoa Pérez, V., Cordero Rodríguez, M., Ayala Hernández, E. (2022). Corazón univentricular asociado a bloqueo auriculoventricular congénito en un paciente adulto. Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 34(1), 1-6.

Bloqueo A-V tercer grado o completo



Imagen

La onda P y el complejos QRS no guardan relación entre sí, siendo la frecuencia de la onda P independiente de la frecuencia de los complejos QRS puede ser ancho o estrecho
R-R regular

Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

<https://mischuletasmedicas.files.wordpress.com/2019/06/av-3.jpg?w=840>

Video YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=-h6DI5vaPx8>

Fuente / Autor video

Externa

URL de la fuente (video)

<https://www.youtube.com/watch?v=-h6DI5vaPx8>

**Opciones no
recomendadas**

bloqueo atrioventricular, bloqueo cardíaco

Comentarios

Con frecuencia abreviado como "bloqueo AV".
