

critically ill COVID-19 patient (paciente crítico con COVID-19)

Término	critically ill COVID-19 patient
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Médico Cirujano (422)
Temática	Enfermedades respiratorias
Definición del término	A person who has been infected with SARS-CoV-2 and has developed critical or life-threatening conditions such as respiratory distress, hypotension, shock, thromboembolism, and/or multi-organ failure, including acute kidney injury, liver failure, and coagulopathy.
Fuente / Autor (del término)	Vania Vázquez Robles con base en World Health Organization. (2022). Clinical classification of COVID-19. https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1466546/retrieve
Contexto del término	The COVID-19 pandemic has caused multiple deaths worldwide. Since no specific treatment for COVID-19 is available, medical management focuses on supportive care. The most severe patients need sustained life support for resuscitation and stabilization, including mechanical ventilation, extracorporeal membrane oxygenation support. This patient with a predicted high risk of death requires intensive care management, including mechanical ventilation, extracorporeal membrane oxygenation support, uremic toxin removal, hemodynamic support, and most importantly, anti-cytokine therapy, and immune modulation. Comprehensive cytokine data will be needed to strengthen the rationale of this strategy.
Fuente / Autor (del contexto)	Tao-Min Huang, T., et al. (2021). Patient Using Continuous Renal Replacement Therapy for Severe COVID-19. <i>Frontiers in medicine</i> . https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34164411/
Equivalente en español	paciente crítico con COVID-19

Categoría gramatical	Nominal (221)
Variante de traducción	paciente críticamente enfermo con COVID-19
Información geográfica de la variante en español	España (Esp.) (194)
Definición del término en español	paciente infectado con SARS-CoV-2 cuya condición puede estar complicada con una enfermedad multiorgánica, que incluye la falla renal y cardíaca
Fuente / Autor (del término en español)	Vania Vázquez Robles con base en Organización Panamericana de la Salud. (2020). Cuidados intensivos para pacientes adultos críticos con COVID-19 en las Américas. Revista Panamericana de salud pública, 63(1), 1-18.
Contexto del término en español	Pregunta 26. En pacientes críticos con COVID-19, ¿cuáles son las prioridades de manejo?
	Recomendamos mantener un alto índice de sospecha de las potenciales manifestaciones neurológicas (encefalopatía, meningoencefalitis y debilidad adquirida en UCI) en el paciente.
Fuente / Autor (del contexto en español)	Vidal-Cortés, P., et al. (2022). Recomendaciones para el manejo de los pacientes críticos con COVID-19. Revista de Medicina Intensiva, 46(2), 81-89.

Population

This recommendation applies only to people with these characteristics:

Imagen



Disease

Non-s

Absence
of sev
critical

Fuente /
Autor
imagen

URL de la
fuente
(imagen)

Stahl-Timmins, W. (2022). Infographic. BMJ. <https://apps.who.int/iris/rest/bitst>

Remision

- [critically ill patient \(paciente crítico\)](#)
- [critical care \(cuidados intensivos\)](#)