

Run-in period (Periodo de preinclusión)

Término	Run-in period
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Química Farmacéutico Biológica (432)
Temática	Farmacovigilancia
Definición del término	<p>A period before a clinical trial is commenced when no treatment is given. The clinical data from this stage of a trial are only occasionally of value but can serve a valuable role in screening out ineligible or non-compliant participants, in ensuring that participants are in a stable condition, and in providing baseline observations.</p>
Fuente / Autor (del término)	<p>Medical Dictionary, run-in period: https://encyclopedia.thefreedictionary.com/Run-in+period Consultado el 29 de mayo de 2018.</p>
Contexto del término	<p>The subjects in Groups A and B were required to have a 2-week run-in period of alendronate treatment prior to randomization.</p>
Fuente / Autor (del contexto)	<p>Amgen Inc. (2013). Synopses of individual studies. AMG 785. Clinical Study Report: 20060223.</p>
Equivalente en español	Periodo de preinclusión
Categoría gramatical	Nominal (221)
Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)

Definición del término en español	Usualmente es un período previo a la inclusión de un sujeto en el ensayo clínico, incluido en el periodo basal, en el que los candidatos reciben un tratamiento equivalente a alguno de los que se evaluará en el ensayo (el placebo o un fármaco) para determinar su tolerancia o aceptación del tratamiento.
Fuente / Autor (del término en español)	Saladrigas, M., et al. (2008) Glosario EN-ES de ensayos clínicos. Panace@. Vol. IX, no. 28. Segundo semestre.
Contexto del término en español	Se requirió que, antes de la aleatorización, los sujetos en los Grupos A y B se sometieran a un periodo de preinclusión de alendronato de dos semanas.
Fuente / Autor (del contexto en español)	Amgen Inc. (2013). Synopses of individual studies. AMG 785. Clinical Study Report: 20060223.
