


benzodiazepine (benzodiacepina)

Término	benzodiazepine
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Médico Cirujano (422)
Temática	Farmacología
Definición del término	A class of drugs that act as tranquilizers and are commonly used in the treatment of anxiety.
Fuente / Autor (del término)	Conrad, M. (29 de marzo de 2021). Medical Definition of Benzodiazepines. MedicineNet. https://www.medicinenet.com/benzodiazepines/definition.htm
Contexto del término	Benzodiazepines, and the related z drugs (zopidem, zopiclone, and zalepon), potentiate the rapid neuroinhibitory effect of the neurotransmitter γ aminobutyric acid (GABA) in the brain and spinal cord. This results in reduction of anxiety, induction of sleep, and muscle relaxation. Consequently, benzodiazepines are commonly prescribed for anxiety and sleep disorders, but are also highly effective as muscle relaxants; for treating epilepsy, alcohol withdrawal syndrome, and acute behavioural disturbance; and as a premedication in anaesthesia.
Fuente / Autor (del contexto)	Hayhoe, B., & Lee-Davey, J. (2018). Tackling benzodiazepine misuse. En BMJ (k3208). BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.k3208
Equivalente en español	benzodiacepina

Categoría gramatical	Nominal (221)
Variante de traducción	benzodiazepina
Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Cada uno de los fármacos derivados de los núcleos 1,4-benzodiazepínico o 1,5-benzodiazepínico.
Fuente / Autor (del término en español)	Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Benzodiazepina. En Diccionario de Términos Médicos. Recuperado el 07 de abril de 2022, de https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=Benzodiazepina
Contexto del término en español	Habían utilizado una benzodiazepina o un análogo de forma prolongada 6.888 pacientes. El 70,9% eran mujeres, el 73,4% tenía 65 años o más, y el 73% estaba adscrito a un centro urbano. La prevalencia global fue del 6,9%, mayor entre las mujeres que entre los varones (9,7% y 4%, respectivamente), y aumentó con la edad hasta un 27,3% entre los pacientes de 75 o más años. En los resultados estratificados se observó que el consumo crónico era superior entre las mujeres de 75 o más años de edad adscritas a centros de salud urbanos, con una prevalencia del 35,7%.
Fuente / Autor (del contexto en español)	Bejarano Romero, F., Piñol Moreso, J. L., Mora Gilabert, N., Claver Luque, P., Ballester López, N., & Basora Gallisa, J. (2008). Elevado consumo de benzodiazepinas en mujeres ancianas asignadas a centros de salud urbanos de atención primaria. En Atención Prim

Imagen



**Fuente /
Autor
imagen**

Externa

**URL de la
fuente
(imagen)**

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Benzodiazepine.svg>

Audio

[Benzodiacepinas - Ai Laket - Podcast en iVoox.mp3](#) (6.48 MB)

**Fuente /
Autor audio**

Externa

URL de la fuente (audio)	https://www.ivoox.com/benzodiacepinas-audios-mp3_rf_16626432_1.html
Video YouTube	https://www.youtube.com/watch?v=d3EYDLKeljQ
Fuente / Autor video	Externa
URL de la fuente (video)	https://www.youtube.com/watch?v=d3EYDLKeljQ
Comentarios	Se usa más la grafía "benzodiazepina", que no se ajusta a la norma ortográfica general en español. Con frecuencia en plural, como nombre de grupo farmacológico.