

Serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC) (Carcinoma intraepitelial tubárico seroso)

Término

Término

Serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC)

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Médico Cirujano (422)

Temática

Cáncer de ovario

Definición del término

A precursor lesion for high-grade pelvic serous carcinoma.

Fuente / Autor (del término)

Monique, H, Susan C, Modesitt, et al. (2015). Serous Tubal Intraepithelial Carcinoma: An Incidental Finding at the Time of Prophylactic Bilateral Salpingo-Oophorectomy, Case Reports in Obstetrics and Gynecology. <https://doi.org/10.1155/2015/760429>

Contexto del término

Although its name suggests an ovarian tissue of origin, for the most common type of ovarian cancer that is high-grade serous cancer, examination of tissues removed during prophylactic, risk-reducingsalpingo-oophorectomy in BRCA1/BRCA2 mutation gene carriers identified the presence of cancer precursor lesions called serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC) in the distal end of the fallopian tube, and not in the

ovary.

Fuente / Autor (del contexto)

Lheureux, S, Braunstein, M, y Oza, A. (2019). Epithelial ovarian cancer: Evolution of management in the era of precision medicine. *CA: a cancer journal for clinicians*, 69(4), 280-304. <https://doi.org/10.3322/caac.21559>

Español

Equivalente en español

Carcinoma intraepitelial tubárico seroso

Categoría gramatical

Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español

México (Mex.) (192)

Definición del término en español

Lesión precursora del carcinoma invasivo de las trompas de Falopio.

Fuente / Autor (del término en español)

González, P, Requerey, M, Frías Z, et al. (2020). Carcinoma intraepitelial tubárico seroso como hallazgo posquirúrgico de endometriosis y útero miomatoso. Reporte de un caso. *Ginecol Obstet Mex*,88(09),625-631 <https://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom>

Contexto del término en español

La salpingooforectomía bilateral profiláctica es un procedimiento que reduce el riesgo de carcinomas peritoneales, tubáricos y serosos de ovario. Las pacientes con carcinoma intraepitelial tubárico seroso deben tener seguimiento basado en controles ecográficos, pruebas de imagen mamarias, determinación de marcadores tumorales y estudios genéticos, debido a su asociación con mutaciones en los genes BRCA 1 y 2.

Fuente / Autor (del contexto en español)

González, P, Requerey, M, Frías Z, et al. (2020). Carcinoma intraepitelial tubárico seroso como hallazgo posquirúrgico de endometriosis y útero miomatoso. Reporte de un caso. *Ginecol Obstet Mex*, 88(09),625-631 <https://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/go>