

# Serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC) (Carcinoma intraepitelial tubárico seroso)

<b>Término</b>	Serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC)
<b>Idioma</b>	Inglés (Estados Unidos) (214)
<b>Área Especialidad</b>	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
<b>Disciplina</b>	Médico Cirujano (422)
<b>Temática</b>	Cáncer de ovario
<b>Definición del término</b>	A precursor lesion for high-grade pelvic serous carcinoma.
<b>Fuente / Autor (del término)</b>	Monique, H, Susan C, Modesitt, et al. (2015). Serous Tubal Intraepithelial Carcinoma: An Incidental Finding at the Time of Prophylactic Bilateral Salpingo-Oophorectomy, Case Reports in Obstetrics and Gynecology. <a href="https://doi.org/10.1155/2015/760429">https://doi.org/10.1155/2015/760429</a>
<b>Contexto del término</b>	Although its name suggests an ovarian tissue of origin, for the most common type of ovarian cancer that is high-grade serous cancer, examination of tissues removed during prophylactic, risk-reducingsalpingo-oophorectomy in BRCA1/BRCA2 mutation gene carriers identified the presence of cancer precursor lesions called serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC) in the distal end of the fallopian tube, and not in the ovary.

<b>Fuente / Autor (del contexto)</b>	Lheureux, S, Braunstein, M, y Oza, A. (2019). Epithelial ovarian cancer: Evolution of management in the era of precision medicine. CA: a cancer journal for clinicians, 69(4), 280–304. <a href="https://doi.org/10.3322/caac.21559">https://doi.org/10.3322/caac.21559</a>
<b>Equivalente en español</b>	Carcinoma intraepitelial tubárico seroso
<b>Categoría gramatical</b>	Nominal (221)
<b>Información geográfica de la variante en español</b>	México (Mex.) (192)
<b>Definición del término en español</b>	Lesión precursora del carcinoma invasivo de las trompas de Falopio.
<b>Fuente / Autor (del término en español)</b>	González, P, Requerey, M, Frías Z, et al. (2020). Carcinoma intraepitelial tubárico seroso como hallazgo posquirúrgico de endometriosis y útero miomatoso. Reporte de un caso. Ginecol Obstet Mex,88(09),625-631 <a href="https://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom">https://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom</a>
<b>Contexto del término en español</b>	La salpingooforectomía bilateral profiláctica es un procedimiento que reduce el riesgo de carcinomas peritoneales, tubáricos y serosos de ovario. Las pacientes con carcinoma intraepitelial tubárico seroso deben tener seguimiento basado en controles ecográficos, pruebas de imagen mamarias, determinación de marcadores tumorales y estudios genéticos, debido a su asociación con mutaciones en los genes BRCA 1 y 2.
<b>Fuente / Autor (del contexto en español)</b>	González, P, Requerey, M, Frías Z, et al. (2020). Carcinoma intraepitelial tubárico seroso como hallazgo posquirúrgico de endometriosis y útero miomatoso. Reporte de un caso. Ginecol Obstet Mex, 88(09),625-631 <a href="https://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/go">https://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/go</a>