

Serous borderline tumor (SBT) (Tumor borderline seroso (TSB))

Término	Serous borderline tumor (SBT)
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Médico Cirujano (422)
Temática	Cáncer de ovario
Definición del término	Serous neoplasms that show epithelial proliferation greater than that seen in serous cystadenomas.
Fuente / Autor (del término)	Srinivasamurthy, B, Ambedkar R, Krishnan N, et al. (2015). Ovarian serous borderline tumors with noninvasive and invasive peritoneal implants: A case report each. Journal of Cancer Research and Therapeutics. 11(3) https://www.cancerjournal.net/article.asp
Contexto del término	In 2007, Russel Hogg et al., studied 46 patients with serous borderline tumors. 13 of 46 (28%) serous borderline tumors had a micropapillary pattern, 12 (26%) had evidence of microinvasion and 19 (41%) had extraovarian implants, of which one (5%) was invasive. Three of 46 (7%) of serous borderline tumors recurred, all were originally advanced stage.

Fuente / Autor (del contexto)	Srinivasamurthy, B, Ambedkar R, Krishnan N, et al. (2015). Ovarian serous borderline tumors with noninvasive and invasive peritoneal implants: A case report each. Journal of Cancer Research and Therapeutics. 11(3) https://www.cancerjournal.net/article.as
Equivalente en español	Tumor borderline seroso (TSB)
Categoría gramatical	Nominal (221)
Variante de traducción	Tumores de bajo potencial de malignidad (borderline tumor)
Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Neoplasias que presentan una mayor proliferación epitelial que los tumores benignos, pero sin invasión destructiva del estroma.
Fuente / Autor (del término en español)	Cisterna, C, Orellana H, Ricardo, y Freiré H. (2007). Tumor ovárico de bajo potencial maligno (borderline): patrón seroso micropapilar. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 72(4), 241-246. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262007000400008
Contexto del término en español	Los tumores serosos borderline (TSB) representan el 25-30% de los tumores serosos potencialmente malignos (14,15). Ocurren más frecuentemente durante la 4. ^a y 5. ^a décadas y la edad media de las pacientes es de 42 años. Aunque suelen ser asintomáticos, pueden acompañarse de aumento del perímetro abdominal y dolor debido a torsión o ruptura.

Fuente / Autor (del contexto en español)

Cisterna, C, Orellana H, Ricardo, y Freiré H. (2007). Tumor ovárico de bajo potencial maligno (boderline): patrón seroso micropapilar. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 72(4), 241-246.
<https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262007000400008>

Opciones no recomendadas

Tumores proliferativos o atípicos.

Comentarios

Tumor borderline seroso (TSB) y tumor de bajo potencial de malignidad (borderline tumor) se utilizan como sinónimos.
