

behavioral pain scale (escala conductual del dolor)

Término

Término

behavioral pain scale

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Médico Cirujano (422)

Temática

Pruebas diagnósticas

Definición del término

Scale used to assess pain in in adults, including those in the intensive care unit (ICU).

Fuente / Autor (del término)

Society of Critical Care Medicine. (s. f.). Behavioral Pain Scale (BPS). Recuperado 1 de julio de 2022, de [https://sccm.org/ICULiberation/Resources/Behavioral-Pain-Scale-\(BPS\)](https://sccm.org/ICULiberation/Resources/Behavioral-Pain-Scale-(BPS))

Contexto del término

Current research shows that the two tools best validated for patients unable to self-report pain are the Behavioral Pain Scale (BPS) and the Critical Care Pain Observation Tool (CPOT).

Fuente / Autor (del contexto)

Kotfis, K., Zegan-Barańska, M., Szydłowski, Ł., Żukowski, M., & Ely, E. W. (2017). Methods of pain assessment in adult intensive care unit patients. Anaesthesiology intensive therapy, 49(1), 66-72.

Español

Equivalente en español

escala conductual del dolor

Categoría gramatical

Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español

México (Mex.) (192)

Definición del término en español

Escala para intentar la evaluación del dolor de los pacientes en Cuidados Intensivos que no pueden manifestarlo con otros tipos de escalas, debido a que están sedados y/o sometidos a ventilación mecánica.

Fuente / Autor (del término en español)

Rubiales, E. (2018, 20 febrero). Behavioral Pain Scale (BPS). SAMIUC. Recuperado 1 de julio de 2022, de <https://www.samiuc.es/behavioral-pain-scale-bps/>

Contexto del término en español

Presentó un coeficiente de Alfa de Cronbach que va de 0,80 a 0,92, el cual otorga, entre los artículos seleccionados, la mayor confiabilidad y validez de criterio a través de este estadígrafo a la Escala conductual del dolor (BPS).

Fuente / Autor (del contexto en español)

Rivas Riveros, E., Alarcón Pincheira, M., Gatica Cartes, V., Neupayante Leiva, K., & Schneider Valenzuela, M. (2018). Escalas de valoración de dolor en pacientes críticos no comunicativos. Enfermería: Cuidados Humanizados, 7(1), 57-77.

Multimedia

Imagen

Item	Description	Score
Facial expression	Relaxed	1
	Partially tightened	2
	Fully tightened	3
	Grimacing	4
Upper limbs	No movement	1
	Partially bent	2
	Fully bent with finger flexion	3
	Permanently retracted	4
Compliance with ventilation	Tolerating movement	1
	Coughing but tolerating ventilation for most of the time	2
	Fighting ventilator	3
	Unable to control ventilation	4

Fuente / Autor imagen

Externa

URL de la fuente (imagen)

<https://www.semanticscholar.org/paper/The-Use-of-the-Behavioral-Pain-Scale-to-Assess-Pain-Ahlers-Veen/9f4636e07d6459cc14eb0ac926d8c31dbe905c53>

Formatos de descarga

- [PDF](#)
- [CSV](#)
- [XLS](#)
- [TXT](#)