


CAM-ICU (método para la evaluación de la confusión en la UCI (CAM-ICU))

Término	CAM-ICU
Idioma	Inglés (Estados Unidos) (214)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Psicología (428)
Temática	Enfermedades y afecciones
Definición del término	A delirium assessment that takes approximately 1 to 2 minutes to perform.
Fuente / Autor (del término)	Emergency Department Delirium (2022). CAM-ICU. Recuperado el 14 de junio de 2022. assessment/cam-icu/
Contexto del término	We hypothesized that reduced arousability (Richmond Agitation Sedation Scale) during delirium assessment increases the apparent prevalence of delirium in intensive care patients. We assessed delirium using the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) and the Confusion Screening Checklist (ICDSC) in intensive care patients during sedation stops, as assessed with RASS score.
Fuente / Autor (del contexto)	Haenggi, M., Blum, S., Brechbuehl, R., Brunello, A., Jakob, S. M., & Takala, J. (2022). The effect of delirium when assessed with CAM-ICU and ICDSC. En Intensive Care Medicine, 27(1), 1-10.
Equivalente en español	método para la evaluación de la confusión en la UCI (CAM-ICU)
Categoría gramatical	Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Herramientas del cuidado intensivo que reporta una alta sensibilidad y especificidad en la detección de delirium en pacientes críticos.
Fuente / Autor (del término en español)	Tobar, E., Romero, C., Galleguillos, T., Fuentes, P., Cornejo, R., Lira, M. T., de la Cruz, G., Morandi, A., & Wesley Ely, E. (2010). Método para la evaluación de la confiabilidad de la monitorización del delirium en pacientes críticos.
Contexto del término en español	La monitorización del delirium implica la incorporación dentro de la práctica clínica de herramientas que permitan diagnosticarlo en pacientes despiertos con ventilación mecánica en estados de conciencia fluctuante. La detección de presencia de delirium desde el momento que ingresan a la UCI es fundamental para la implementación del CAM-ICU (Tobar et al., 2008). La implementación del CAM-ICU en este estudio permitió tener un acceso más temprano al diagnóstico de delirium, lo que permitió una mayor utilización en las investigaciones (Wesley & Margolin, 2001;Tobar et al., 2010). El CAM-ICU es una herramienta de ventilación mecánica de la última década.
Fuente / Autor (del contexto en español)	Tobar, E., Romero, C., Galleguillos, T., Fuentes, P., Cornejo, R., Lira, M. T., de la Cruz, G., Morandi, A., & Wesley Ely, E. (2010). Método para la evaluación de la confiabilidad de la monitorización del delirium en pacientes críticos.

Imagen



**Fuente /
Autor
imagen**

Externa

**URL de la
fuente
(imagen)**

<https://multimedia.elsevier.es/PublicationsMultimediaV1/item/multimedia/S02>

**Video
YouTube**

<https://www.youtube.com/watch?v=NZ3rQCAk5sA>

**Fuente /
Autor video**

Externa

**URL de la
fuente
(video)**

<https://www.youtube.com/watch?v=NZ3rQCAk5sA>
