

2nd degree AV Block (bloqueo AV de segundo grado)

Término

Término

2nd degree AV Block

Idioma

Inglés (Estados Unidos) (214)

Área Especialidad

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)

Disciplina

Médico Cirujano (422)

Temática

Cardiología

Definición del término

The impulses are intermittently blocked and it is classified into two types: Mobitz Type I (the electrical signal gets slower and slower until your heart actually skips a beat); Mobitz Type II: (the heartbeat becomes irregular and slower than normal).

Fuente / Autor (del término)

Cleveland Clinic. (2008). Heart Block. Recuperado el 20 de septiembre de 2022, de <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17056-heart-block>

Contexto del término

Asymptomatic, low grade AV block (1st degree or type I second degree) is often an incidental finding, usually reflecting prior ischemic disease or myocyte damage.

Fuente / Autor (del contexto)

Wiese, J. G., & Moscona, J. (2019). AV block- 1st, 2nd and 3rd degree blocks. Cancer Therapy Advisor. <https://www.cancertherapyadvisor.com/home/decision-support-in-medicine/hospital-medicine/av-block-1st-2nd-and-3rd-degree-blocks/>

Español

Equivalente en español

bloqueo AV de segundo grado

Categoría gramatical

Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español

México (Mex.) (192)

Definición del término en español

El bloqueo auriculoventricular (AV) es una interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos procedentes de las aurículas a los ventrículos. Existen dos tipos: Mobitz tipo I, el intervalo PR se prolonga de manera progresiva con cada latido hasta que un impulso auricular no se conduce y desaparece el complejo QRS; y Mobitz tipo II, el intervalo PR permanece constante.

Fuente / Autor (del término en español)

Brent Mitchell, L. (s/f). Bloqueo auriculoventricular. Manual MSD versión para profesionales. Recuperado el 20 de septiembre de 2022, de <https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/trastornos-cardiovasculares/arritmias-y-trastornos-de-la-conduccion>

Contexto del término en español

Esta indicado implantar marcapaso definitivo en los pacientes con Bloqueo AV de tercer grado o de segundo grado que aparece durante el ejercicio en ausencia de isquemia miocárdica.

Fuente / Autor (del contexto en español)

Instituto Mexicano del Seguro Social. (s/f). Guía de Referencia Rápida. Bloqueo Auriculoventricular Indicaciones para el implante de Marcapaso Permanente. <http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/352GRR.pdf>

Multimedia

Fuente / Autor video

Externa

URL de la fuente (video)

Vargas, D. (31 de enero de 2021). BLOQUEO AURICULO VENTRICULAR DE 2do GRADO. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=6Swe-8q2xzc>

Notas para la traducción

Remision

- [12 Lead Electrocardiogram \(EKG\) \(electrocardiograma de 12 derivaciones \(ECG\)\)](#)
- [1st degree AV Block \(bloqueo AV de primer grado\)](#)