

Patent infection (Infección patente)

Término	Patent infection
Idioma	Otra variante del inglés (216)
Área Especialidad	Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (403)
Disciplina	Medicina Veterinaria y Zootecnia (423)
Temática	Parasitología
Definición del término	An infection is patent when direct evidence of the organism can be detected symptoms have appeared.
Fuente / Autor (del término)	The Australian Society for Parasitology (s.f.). Overview of Parasitology. https://www.aspa.asn.au/site/introduction/introduction-essay.html#:~:text=An%20infection%20is%20patent%20when,illness%2C%20
Contexto del término	Two weeks after first egg administration, a sharp increase of specific antibody increased eosinophilic counts indicated larval invasion in all infected dogs. 42 infection, patent infections were detected coproscopically in all animals of group 1. uninfected dogs (group 2) or the infected and treated dogs (group 1).
Fuente / Autor (del contexto)	Fahrion, A.S., Staebler, S. & Deplazes, P. (2008, 25 de marzo). Patent Toxocar exposed and in helminth-free dogs after infection with low numbers of embry Parasitology, 152(1-2), 108-115. https://doi.org/10.1016/j.par.2008.03.001
Equivalente en español	Infección patente
Categoría gramatical	Nominal (221)

Información geográfica de la variante en español	México (Mex.) (192)
Definición del término en español	Infección en la que el agente, estadios de desarrollo o productos metabólicos hospedador y puede ser detectado en sangre o tejidos.
Fuente / Autor (del término en español)	Cruz-Reyes, A. & Camargo-Camargo, B. (2000). Glosario de términos en Parasitología. Plaza y Valdes.
Contexto del término en español	Las larvas que pasan de la madre al feto permanecen en el hígado fetal hasta el nacimiento, en el cual comienzan su migración a los pulmones, sin que se conozca todavía la vía de reestimulación. Durante la primera semana de vida del animal, las larvas llevan a cabo la traqueal mudando al cuarto estadio en los pulmones o en el estómago, a los 10 días los adultos en el duodeno del cachorro. Esta infección prenatal de cachorros es endémica y probablemente todos nacen infectados, desarrollando la mayoría una infección asintomática (García 2011).
Fuente / Autor (del contexto en español)	Martínez Barrios, A. N. (2014). Seroprevalencia de Toxocara spp en niños de 0 a 5 años de edad de licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México]. Repositorio Institucional. http://hdl.handle.net/20.500.11799/32659
Comentarios	La toxocariasis es una infección que se transmite de perros o gatos al ser humano por los parásitos Toxocara canis y Toxocara cati. Fuente: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2020, 3 de septiembre). https://www.cdc.gov/parasites/toxocariasis/gen_info/faqs.html